

Vi raccomandiamo di mettere in pratica tutte le precauzioni per evitare gli infortuni SEMPRE e soprattutto nei giorni successivi al trauma cranico!



SERVIZI UTILI a cui rivolgersi:

- **Pediatra di libera scelta:** risponde al telefono secondo gli orari di reperibilità da lui indicati.
- **Punto di Assistenza Pediatrica Territoriale:** tutti i sabato mattina dalle 8:30 alle 12:30 presso l'ambulatorio pediatrico dell'ospedale di Borgomanero.
- **Servizio di Guardia Medica:** dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, sabato e domenica e nei giorni festivi 24 ore su 24.
- **Pronto Soccorso Pediatrico:** passare prima in Pronto Soccorso degli adulti per il triage.

Pediatria e Neonatologia
Borgomanero

*Con voi per i
vostri bambini*



Azienda Sanitaria Locale NO
S.C. Pediatria/Neonatologia
Direttore Dott.ssa S. De Franco
Tel/fax 0322-848.275
Email: pediatria.bor@asl.novara.it

**COSA
DOVETE
SAPERE
SE IL VOSTRO
BIMBO HA
BATTUTO LA
TESTA**





Dopo la visita in seguito a trauma cranico **devi osservare il tuo bimbo**, in particolare nelle prime 24h dal trauma:

- Tienilo in un ambiente tranquillo, e non metterti in viaggio!
- Metti del ghiaccio a cicli sulla zona contusa se il bimbo non si oppone.
- Per 1 -2 giorni prepara pasti leggeri.



Cosa controllare nelle prime 24H?

Quando è sveglio:

- che si muova normalmente.
- che afferri oggetti a lui cari con braccia e manine.
- se è grandicello, chiedigli di parlare, di dire nomi di persone o giochi che conosce.

Mentre dorme:

- controlla che abbia una posizione rilassata e il respiro regolare.
- controlla che sia risvegliabile, toccando una manina o un piedino.

Riportate subito il bimbo in ospedale se:

- tende ad addormentarsi senza motivo, fatica a tenere gli occhi aperti in ore per lui insolite
- ha difficoltà nel parlare e nella comprensione
- ha disturbi dell'equilibrio e difficoltà a camminare
- è irritabile o presenta pianto lamentoso continuo, specie se molto piccolo
- ha mal di testa forte e persistente (anche dopo assunzione di antidolorifico)
- presenta vomito ripetuto a distanza dal trauma
- ha disturbi della vista e/o pupille di grandezza diversa
- perde liquido e/o sangue da naso e/o orecchie
- compare ematoma o tumefazione molle del capo
- presenta convulsioni.